

AGRI.FÊTE À GENÈVE

GENÈVE
terroir



Genève, le 12 juillet 2023 – L'agriculture genevoise a fait son « chaud » estival à Carouge. Agri.Fête a tenu son pari de venir à la rencontre des habitants du canton et de mettre le terroir local à l'honneur. L'ensemble des filières de l'agriculture genevoise tire un excellent bilan de la manifestation qui a attiré près de 20 000 personnes entre le vendredi 7 et le dimanche 9 juillet. L'occasion d'expliquer et de rappeler l'importance d'une agriculture de proximité. A la vue du succès, une édition 2024 verra probablement le jour.

Photo : Bertrand Carlier.

LE FRELON ASIATIQUE SE PROPAGE EN SUISSE

Après la première observation en 2017, le nombre de découvertes de l'espèce exotique a nettement augmenté dans notre pays en 2022. Le frelon asiatique poursuit son expansion en Suisse romande et dans le nord-ouest de la Suisse. Pour protéger l'entomofaune indigène et les colonies d'abeilles mellifères, il est très important de détruire rapidement le plus grand nombre possible de nids de cette espèce invasive. Le Service sanitaire apicole (SSA) invite la population à signaler toute observation via www.frelonasiatique.ch.

Le frelon asiatique *Vespa velutina* fait partie des espèces invasives (néobiotes). En 2022, il a été repéré sur 24 sites dans 8 cantons (AG, BL, FR, GE, JU, NE, SO et VD), et cette année, il y a déjà eu 66 découvertes dans 7 cantons. Pour nourrir leurs larves, les frelons asiatiques chassent les insectes, en particulier les abeilles sauvages et domestiques. A ce jour, cette année, nous comptons 110 découvertes dans 8 cantons. À la fin de l'été, lorsque la nourriture disponible dans la nature diminue, ils s'attaquent de plus en plus aux colonies d'abeilles. En cas de pression extrême des frelons, une colonie d'abeilles peut en mourir. Jusqu'à présent, cela n'est pas encore le cas en Suisse.

Bon à savoir

« Bien que le frelon asiatique soit dangereux pour les insectes, il n'est en principe pas agressif envers les humains », explique Marianne Tschuy du Service sanitaire apicole : « *Vespa velutina* protège et défend son nid. Les destructions de nids doivent donc être exclusivement confiées à des spécialistes formés. » « Le frelon asiatique est facilement reconnaissable grâce à différentes caractéristiques », ajoute Fabian Trüb, spécialiste de la santé des abeilles : « Il est légèrement plus petit que l'espèce indigène. Sa couleur principale est le noir avec de fines



Photo : Q. Rome / MNHN.

bandes jaunes sur l'abdomen et l'extrémité de ses pattes est jaune. Au printemps, il construit un petit nid primaire, souvent à 0.5–3 m du sol, à l'abri des intempéries, et un nid secondaire en été. Ce dernier devient beaucoup plus grand et se trouve généralement dans la couronne des grands arbres ».

Annoncer des suspicions

Pour ralentir la propagation de *Vespa velutina* et maintenir la densité des nids à un faible niveau, il est essentiel de recevoir des informations en temps réel de la part de la population (www.frelonasiatique.ch). En raison des confusions fréquentes avec des espèces indigènes en partie protégées, il est peu judicieux de tuer les insectes observés. Pour une identification claire, une photo ou une vidéo suffit. Apiservice Jakob Signer-Strasse 4, 9050 Appenzell, www.abeilles.ch/apiservice.

→ Informations complémentaires (lieux d'observation 2023 et aide-mémoire pour les apiculteurs) : <https://abeilles.ch/apiculture/sante-des-abeilles-pratique-apicole/frelon-asiatique/>

